

रामतोरियाका मुख्य कीराहरू र तिनको रोकथाम

छिर्के गवारो (Spotted Bollworm):

लाभ्रेले मुना, कोपिला, फूल र चिचिला प्वाल पारेर भित्र-भित्र खाइदिन्छन् तथा चिचिलाहरू भर्दछन् । फल खान लायक हुँदैन ।

रोकथाम:

- फलहरू छिटो टिप्नुपर्दछ
- घाउ लागेका फलहरू जम्मा गरेर माटोमा गहिरो गरी गाड्नुपर्दछ ।
- साइपरमेथ्रिन २ मि.लि प्रतिलिटर पानीमा छर्कनुपर्दछ ।



फडके (Leaf Hopper):

यसका माउ र बच्चा दुवैले पातको तल्लो सतहमा बसेर रस चुस्दछन् । पातको किनारबाट पहेँलिन्छ, र पछि खैरो-रातो रंगको हुन्छ ।

रोकथाम:

मालाथियन (०.०५%), फेन्भेलेरेट (०.०२%) वा साइपरमेथ्रिन (०.०२%) ले बालीमा छर्कनुपर्दछ ।



(स्रोत: तरकारी खेती प्रविधि – कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, चैत / २०६८)

नोट : प्रकाशकको अनुमति बिना यस प्रकाशनको बिक्री वितरण वा कुनै पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन । यस सामग्रीमा दिइएको जानकारी विभिन्न विज्ञको सल्लाह तथा अन्य संघसंस्थाले प्रकाशन गरेका सामग्रीमा दिइएको जानकारीका आधारमा निर्माण गरिएका हुन् । यसमा समुदायले आफ्नो प्रयासमा गर्न सक्ने जानकारी दिइएको छ । तर विशेष परिस्थितिमा पुनः सम्बन्धित विज्ञको सल्लाह लिनु पर्नेछ ।