

केरा खेती

लगाउने र फल उत्पादन गर्ने समय

- चितवनमा यी जातका केराहरूलाई माघको तेस्रो सातापछि फाल्गुन १५ सम्म लगाएमा असोज-कार्तिक पछि फल तयार हुन्छ। ढिलो गरी लगाएमा, असोज देखि माघसम्मको समयमा प्रशस्त मात्रामा फल उत्पादन हुन गई बजारको समेत समस्या हुन्छ।
- विलियम हाईब्रिड, अष्ट्रेलियन हाईब्रिड र भ्वापाली मालभोग लाई ढिलो गरी (फाल्गुनपछि) लगाएमा जाडोमा पसाउने र चिसोको कारणले गर्दा फल उत्पादन राम्रो हुँदैन।

सकरको छनोट तथा लगाउने तरिका

- केराको विरुवा टिस्यू कल्चर र सकरहरूवाट प्रसारण गर्न सकिन्छ। टिस्यू कल्चरको विरुवा लगाएमा पछि समस्या कम आउने हुन्छ। सकरवाट खेती गर्दा केराको लगाउने सकर श्रावण-भाद्रमा निस्केका तरवारे सकर (sword sucker) छनौट गर्नु पर्छ।
- सबै बोटहरू एकनासका र एकैपटक फल उत्पादन गर्न तरवारे सकरवाट समान आकारको गानाहरू जमिन सरहको भागबाट नै काटेर माथिको भागलाई छुटाउन पर्दछ र गानोलाई मात्र प्रसारण गर्न उपयुक्त हुन्छ।
- घना खेतीको लागि १.५-२.० x १.५-२.० मिटर र लामो समयको उत्पादनको लागि दुई लाईन पद्धतिमा खेती गर्नु पर्छ। दुई लाईन पद्धतिमा खेती गर्दा दुई लाईन १ देखि २ मिटरको दुरीमा लगाउने ४ मिटर जग्गा छाडेर फेरी २ लाईन लगाउने र यसै क्रमले पूरा बगैचा लगाउनु पर्दछ। बगैचामा प्रकाश जाओस् भन्ने हेतुले उत्तर दक्षिण गरेर लाईन बनाउनु पर्दछ।
- घना गरेर केरा लगाएमा विरुवा कमजोर हुने, रोग र किराको प्रकोप बढी हुने, कोशाको संख्या कम लाग्ने, हाताहरू टाढा टाढा लाग्ने, कोशाको आकार सानो र कोशाहरू कमजोर भई फुट्ने र सजिलै भाँचिने र ढल्ने गर्दछ।

मलखाद र सिंचाई

- प्राङ्गारिक मल २०-२५ के.जी, नाईट्रोजन १५० देखि २५० ग्राम, फस्फोरस १००-१५० ग्राम, पोटास १५० देखि २५० ग्राम तत्व प्रतिबोट प्रयोग गर्नु पर्दछ।
- शुष्म तत्वहरूको मिश्रण १०-१५ ग्राम प्रतिबोटको दरले हाल्नुपर्दछ।
- मल राखेपछि सिंचाई गर्नुपर्दछ। डबल लाईन पद्धतिमा हरियो मल, कोषेवाली लगाएमा माटोको गुणस्तर कायम राख्न मद्दत पुग्दछ।